



ワクチン		種類	乳児期									幼児期						学童期／思春期																					
			生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上															
B型肝炎		ユニバーサル	不活化			①	②				③																(注1)												
ロタウイルス	母子感染予防	① ②							③																														
	1価	生			①	②	(注2)																																
肺炎球菌 (PCV15、PCV20)		不活化			①	②	③						④															(注4)											
5種混合 (DPT-IPV-Hib)		不活化			①	②	③						④																						15歳未満まで使用可能				
3種混合 (DPT)		不活化																			① (注5)					② 11-12歳 (注6)													
2種混合 (DT)		不活化																								① 11歳	12歳												
ポリオ (IPV)		不活化																		① (注7)																			
インフルエンザ菌 b型 (ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合		不活化		①	②	③							④														(注8)												
4種混合 (DPT-IPV)		不活化		①	②	③							④									7.5歳まで											15歳未満まで使用可能						
BCG		生					①																																
麻疹・風疹混合 (MR)		生											①								② (注9)																		
水痘		生											①			②											(注10)												
おたふくかぜ		生											①							② (注11)																			
日本脳炎		不活化											生後6か月から接種可能		① (注12)	③	7.5歳まで						④ 9-12歳																
不活化インフルエンザ		不活化											生後6か月から接種可能		毎年 (10、11月など) ① ②																	13歳以上①							
経鼻弱毒生インフルエンザ		生																																					
新型コロナ		mRNA											製剤により使用できる年齢が異なる																										
ヒトパピローマ ウイルス (HPV)	9価	不活化																																					
	2価・4価	不活化																																					
ワクチン		種類	生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳											10歳以上					

定期接種の  
推奨期間定期接種の  
接種可能な期間任意接種の  
推奨期間任意接種の  
接種可能な期間添付文書には記載されていないが  
小児科学会として推奨する期間健康保険での  
接種時期