



ワクチン			種類	母子 免疫 (妊婦中)	乳児期										幼児期					学童期／思春期									
					生 直 後	6 週	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9-11 か 月	12-15 か 月	16-17 か 月	18-23 か 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳以上			
RSウイルス	母子免疫	不活化	(注1)																										
B型肝炎	ユニバーサル	不活化				①	②					③		(注2)															
	母子感染予防			①	②				③																				
ロタウイルス	1価	生				①	②	(注3)																					
	5価					①	②	③	(注4)																				
肺炎球菌 (PCV15、PCV20)			不活化				①	②	③					④					(注5)										
5種混合 (DPT-IPV-Hib)			不活化				①	②	③					④				7.5歳まで	15歳未満まで使用可能										
3種混合 (DPT)			不活化	(注6)														① (注7)			② 11-12歳 (注8)								
2種混合 (DT)			不活化																			① 11歳	12歳						
ポリオ (IPV)			不活化																① (注9)										
インフルエンザ菌b型 (ヒブ) ※アクトヒブ®で初回接種する場合			不活化				①	②	③					④					(注10)										
BCG			生							①																			
麻疹・風疹混合 (MR)			生											① (注11)				② (注11,12)											
水痘			生											①		②			(注13)										
おたふくかぜ			生											①				② (注14)											
日本脳炎			不活化								生後6か月から接種可能						① ②	③	7.5歳まで		④ 9-12歳								
不活化インフルエンザ			不活化								生後6か月から接種可能				毎年 (10、11月などに) ① ②					13歳以上①									
経鼻弱毒生インフルエンザ			生													2歳以上～19歳未満に		毎年 (10月、11月などに) ① 点鼻											
新型コロナ			mRNA								製剤により使用できる年齢が異なる																		
ヒトパピローマ ウイルス (HPV)	女性	9価 (注15)	不活化																				小6	中1① ②	中2～高1相当 (注16)				
	男性	9価	不活化																				中1①② (注17,18)						
ワクチン			種類	母子 免疫 (妊婦中)	生 直 後	6 週	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9-11 か 月	12-15 か 月	16-17 か 月	18-23 か 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳以上			

定期接種の推奨期間
定期接種の接種可能な期間
任意接種の推奨期間
任意接種の接種可能な期間
添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
健康保険での接種時期